


- برای جلوگیری از خونریزی از حرکت کردن خودداری کنید، زیرا تحرک شدید باعث خونریزی از پا می شود.


در آنژیو قلب چه اتفاقی می افتد؟



- بعد از آنژیوگرافی چه کاری انجام می شود؟**
- ممکن است بعد از آنژیوگرافی دچار احساس زیاد یا کم شدن ضربان قلب، گرگرفتگی و گرمی و قرمزی، تهوع استفراغ، خواب آلودگی یا بی حالی شوید.
- در صورت احساس گرمی و درد، حرکت مایع و احساس خستگی در محل عمل فوراً پرستار را در جریان قرار دهید، چون ممکن است محل خونریزی کرده باشد. هر گونه احساس گرختی، بی حسی و گزگز شدن پا را اطلاع دهید.

حین آنژیوگرافی چه کاری انجام می شود؟

- محل ورود سوزن مخصوص آنژیوگرافی که معمولاً روی کشاله ران است توسط محلول ضد عفونی شستشو داده می شود.
- پزشک محل ورود سوزن آنژیوگرافی را با داروی بی حسی موضعی، بی حس می نماید و لوله مربوطه را وارد رگ می نماید.
- ممکن است از شما خواسته شود که نفس خود را نگه دارید و یا سرفه کنید، این کار باعث می شود کیفیت فیلم آنژیوگرافی شما مطلوب تر شود.
- در نهایت شما در بخش آنژیوگرافی یا سی سی یو بر می گردید.




- بعد از انجام آنژیوگرافی حدود ۱۵ تا ۲۰ دقیقه در اتاق بهبودی می مانید تا خونریزی کنترل گردد.
- محل انجام آنژیوگرافی پانسمان شده و کیسه شن روی آن قرار می گیرد.

آنژیوگرافی قلب چیست؟

آنژیوگرافی روش تهاجمی و کم خطری است که اطلاعات کاملی راجع به آناتومی محل و میزان گرفتگی رگ های قلبی می دهد. آنژیوگرافی به پزشک شما کمک می کند تا بررسی نماید که آیا شما نیاز به درمان هایی مانند جراحی، بازکردن عروق با استنت و بالون یا درمان دارویی دارید یا خیر؟

نکات قبل از آنژیوگرافی را می دانید؟

- قبل از پذیرش در بیمارستان موهای زائد بدن را از ناحیه ناف تا زانو در هر دو پا تراشیده شود.
- از ۸ ساعت قبل غذایی جامد و از ۳ ساعت قبل مایعات میل نکنید.
- برای اتصال سرم و تزریق دارو معمولاً یک رگ از شما گرفته می شود.



- نبض روی پا، نبض قوزک پا، پشت پا و زانو کنترل و علامت زده می شود.
- به دستور پزشک به شما آرامبخش داده می شود.


بسمه تعالی



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیلان

بیمارستان دکتر پیروز لاهیجان

آنژیوگرافی قلب چیست؟



آموزش به مددجو

آموزش سلامت بیمارستان دکتر پیروز


۱۴۰۳

PIROZ PAM. TPC. EDH

فردای ترخیص پانسمان محل عمل برداشته و دوش بگیرید و از لحاظ خونمردگی محل را بررسی کنید و تا یک هفته در وان حمام نداشته باشید.

کبودی کشاله ران طبیعی است و تا دو هفته خود به خود خوب می شود.

در صورت وجود مشکلات حرکتی در انگشتان پا، خونریزی و تورم پا و سردی آن به نزدیک ترین محل در مانی مراجعه کنید.



منبع:

فردوسی، ر، اشرفی، ح و تقدیسی، ش، (۱۳۸۸)، آنژیوگرافی برای پرستاران، تهران، همایش

شماره تلفن بیمارستان: ۰۳-۴۲۲۳۵۵۰۱

نکات قابل توجه برای شما مددجوی محترم:

۱-

۲-

۲ تا ۳ ساعت بعد از آنژیوگرافی از خوردن غذا پرهیزید. سپس با نظارت پرستار مصرف مایعات با مقدار کم را شروع کنید و در صورت تحمل مواد جامد را بخورید.

حدود ۸ تا ۱۰ ساعت بعد از عمل شما می توانید به آرامی و با نظارت پرستار از تخت پایین بیایید.

پس از ترخیص چه پیگیری نیاز است؟

اکثر بیماران صبح بعد از آنژیوگرافی مرخص هستند و فقط بیمارانی که باید جهت ادامه روند درمان آنان اقدام شود، بستری می شوند.



مراقبت های بعد از

آنژیوگرافی

در منزل



آنژیوگرافی چیست؟

یک روش تشخیصی بیماری های مختلف قلبی و عروقی منتهی به قلب را مورد بررسی دقیق قرار می دهد

کاربرد آنژیوگرافی چیست؟

- بیماری نارسایی وریدی
- بیماری عروق کرونر
- عروقی محیطی
- عروق ترومبوز وریدی



مراقبت های لازم از محل زخم آنژیوگرافی

- مرطوب کردن جیبی
- تمویض باند محل زخم هر روز
- شستن محل زخم با آب و صابون
- خشک کردن محل زخم با پارچه استریل
- عدم استعمال پماد و کرم تا زمان بهبودی

مصرف دارو بعد از آنژیوگرافی

توجه به مصرف داروهایی که پزشک بعد از آنژیوگرافی برای شما تجویز خواهد کرد



زمان برگشت به کار بعد از آنژیوگرافی

پزشک با در نظر گرفتن نوع کارتان ممکن است بعد از ۳ روز مجوز فعالیت را به شما بدهد



تهیه شده در تیم تولید محتوای iranshahrhospital.net

