

اهمیت تغذیه با شیر مادر را می دانید؟

تغذیه با شیر مادر سبب رشد و تکامل مطلوب و بقاء کودک می شود. شیر مادر حاوی انواع سلول های زنده دفاعی و عوامل مهم حفاظتی و ضد میکروبی است که شیر مصنوعی (از شیر گاو تهیه می شود). فاقد آن می باشد. ترکیب شیر مادر بر حسب سن و نیاز شیرخوار و همچنین از شروع تا پایان هر وعده تغذیه با شیر مادر، مابین دفعات مختلف شیردهی و نیز در طول روز نفیس می کند.

وضعیت صحیح بغل کردن شیر خوار برای شیر دهی را می شناسید؟



خوابیده به پهلو

نکات کلیدی وضعیت پستان گرفتن صحیح کدامند؟

لب تحتانی به سمت بیرون برگشته است.

چانه کودک در تماس با پستان مادر است.

قسمت کوچکی از هاله در بالای لب فوقانی دیده می شود.

علایم مکیدن موثر را می دانید؟


* با ورود شیر به دهان شیرخوار، مکیدن ها آرام و عمیق و گاهی با مکث است.

* صدای قورت دادن شیرخوار شنیده می شود و یا بلع او مشاهده می شود.

پستان باید به گونه ای در دست مادر قرار گیرد که انگشتانش عقب تر و با فالصه از هاله قرار گیرد، باید انگشت شست در بالا و سایر انگشتان زیر پستان و یا چسبیده به قفسه سینه قرار گیرند.

نحوه صحیح پستان گرفتن شیر خوار چگونه است؟

مادر باید با نوک پستانش لب فوقانی شیرخوار را لمس کند تا او دهانش را باز نماید. برای گرفتن قسمت زیادی از پستان و هاله باید دهان او کاملا باز شود. سپس او را به آرامی به طرف پستان خود بیاورد و نباید خودش یا پستان را به طرف او حرکت دهد.



* حین تغذیه گونه ها گرد و بو آمده است.

* شیرخوار پس از شیرخوردن، خود پستان را رها می کند و راضی به نظر می رسد.

تغذیه انحصاری کودک به چه معنی است؟

* شیرخوار تا پایان ۶ ماهگی فقط باید با شیر مادر تغذیه شود و هیچ نوع ماده غذایی و آشامیدنی دیگری حتی آب به او داده نشود. دادن دارو در صورت لزوم و قطره های مولتی ویتامین یا مواد معدنی و تغذیه با شیر دوشیده شده مادر اشکالی ندارد.

* از گول زنک و شیشه شیر نباید استفاده شود.

* تغذیه مکور در روز و شب لازم است، پس دفعات و مدت مکیدن شیرخوار نباید محدود شود.

* از پایان شش ماهگی به بعد باید تغذیه با شیر مادر همراه با شروع غذای کمکی ادامه یابد. شیردهی بهتر است تا پایان دو سالگی ادامه یابد.

نیاز به مکمل چگونه است؟

دادن قطره مولتی ویتامین یا قطره A+D از ۵-۳ روزگی نوزاد شروع شده و روزانه ۱ سی سی قطره D+A یا مولتی ویتامین تا پایان دو سالگی به کودک داده می شود. قطره آهن نیز از پایان شش ماهگی یعنی همزمان با شروع تغذیه تكمیلی کودک، روزانه ۱۵ قطره داده می شود و تا پایان دو سالگی ادامه می یابد.

تغذیه مادر شیرده را در دوران شیردهی می دانید؟

* مادرانی که دارای تغذیه مناسب هستند نیازی به دستورات غذایی خاص ندارند. هیچ غذای مخصوصی وجود ندارد که حتما در برنامه غذایی مادر شیرده گنجانده شود.

بسمه تعالیٰ



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیلان
بیمارستان دکتر پیروز لاهیجان

در رابطه با تغذیه با شیر مادر نوزاد خود چه می‌دانید؟



آموزش به مددجو

آموزش سلامت بیمارستان دکتر پیروز لاهیجان

۱۴۰۳

PIROZ PAM. TPC. EDH



تغذیه نوزاد نارس با شیر مادر چگونه است؟

بهترین تغذیه برای نوزاد نارس، شیر مادر خودش می‌باشد.

برای نوزادان نارس با سن داخل رحمی بیش از ۳۶ هفته می‌توان تغذیه با شیر مادر را در صورت مناسب بودن وضعیت بالینی مادر و نوزاد از پستان مادر شروع کرده و ادامه داد.

در نوزادان با سن داخل رحمی کمتر از ۳۶ هفته معمولاً شروع تغذیه با شیر دوشیده شده مادر از طریق فنجان یا قاچق یا در صورت نیاز با لوله معده است. هر وعده تغذیه با لوله معده به مدت ۲۰ تا ۲۵ دقیقه طول می‌کشد. این روش بهترین روش تغذیه نوزاد بین ۲۸ تا ۳۶ هفته است.

تعريف گروه حامی را می‌دانید؟

گروه حامی یا گروه حمایت مادر و کودک در زمینه شیردهی افرادی هستند که زیر نظر بیمارستان و مرکز بهداشت مادر را در امور شیر دهی کمک می‌کنند.

شماره تماس بیمارستان: ۰۱۳-۴۲۲۳۵۵۰۱-۳

منابع:

۱. تغذیه با شیر مادر - یونیسف برای همه کودکان- گردآوری اداره سلامت

کودکان وزارت بهداشت ۱۴۰۰

۲. راهنمای مادران برای تغذیه ذبا شیر مادر، سید حامد برکاتی و

همکاران ۱۳۹۴

* هیچ ماده غذایی مخصوصی وجود ندارد ه از رژیم غذایی مادر شیرده حذف شود مگر در موارد استثنائی.

* بهتر است غذاهای تازه، سالم و متنوع در برنامه غذایی مادر وجود داشته باشد. غذاهای گوناگونی که مادران شیرده از سفره خانواده دریافت میکنند باعث میشود کودک از طریق شیرمادر با مزه های مختلف آشنا شده و تغذیه تکمیلی را آسانتر قبول می کند و برای استفاده از مواد غذایی در سفره خانواده آماده میشود.

علایم کفایت شیر را می‌شناسید؟

* وزن کردن دوره ای شیرخوار و رسم منحنی رشد بر روی کارت رشد برای اطیانیان از وزن گیری مناسب

* دفع ادرار از روز چهارم تولد؛ تعداد ۶ کهنه مرطوب یا بیشتر در ۲۴ ساعت با ادرار کمرنگ

* ۳ تا ۸ بار اجابت مزاج در ۲۴ ساعت که پس از یک ماهگی این دفعات کم می‌شود.

علایم گرسنگی نوزاد را می‌دانید؟

۱. **علایم زودرس:** * کودک دهانش را باز می‌کند و به دنبال پستان می‌گردد. * صدا یا حرکات مکیدن را نشان می‌دهد و لبهاش را می‌لیسد.

* دستش را در دهانش می‌کند. * حرکات سریع چشمی دارد، چشم هایش را باز می‌کند.

۲. **علایم دیورس:** * سرش را جلو و عقب می‌برد و اخم می‌کند. * بسی قرار است و ممکن است گریه کند و اگر پاسخی نشوند به خواب می‌روند. **نکته:** در این حالت ممکن است حتی به محض قرار گرفتن در زیر پستان را نگیرد.

