

تشخیص:

پزشکان با استفاده از یک وسیله به نام اتوسکوپ می توانند گوش خارجی و پرده گوش را دیده و تغییرات پرده گوش را تشخیص دهند. دو تست دیگر نیز برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر ممکن است استفاده شود.

- ♦ تست شنوایی سنجی: که در آن سطح شنوایی مورد بررسی قرار می گیرد.
- ♦ تمپانوگرام: که با اندازه گیری فشار گوش میانی، کارکرد شیپور استاش و تحرک پذیری پرده صماخ را بررسی می کند.



درمان

لازم است که دوره درمان آنتی بیوتیک تا انتها طی شود حتی اگر سریعاً و پس از چند روز علائم بیماری فروکش کند، زیرا درمان ناقص باعث عود مجدد بیماری می شود. علاوه بر آنتی بیوتیک ممکن است آنتی هیستامین (در صورت همراهی بیمار با حساسیت) و یا ضد احتقان (خصوصاً سرماخوردگی) توسط پزشک تجویز شود. همچنین تجویز ضد درد و ضد تب نیز ممکن است ضرورت پیدا کند. اگر علائم پس از چند روز تخفیف پیدا نکرد، دوباره با پزشک خود مشورت کنید.

گاهی در درمان عفونت گوش میانی نیاز به اقدامات دیگری از قبیل جراحی می باشد. این عمل زمانی انجام می گیرد که بیمار درد شدیدی دارد و پرده گوش بسیار برجسته بوده و هر آن ممکن است پاره شود. در این موارد جراح با تیغ خود یک برش کوچک روی پرده گوش ایجاد می کند که هم باعث خروج چرک و ترشحات شده و هم درد را کاهش می دهد و از هم مهمتر از پاره شدن وسیع خودبخودی پرده گوش جلوگیری می کند. البته این برش در عرض چند روز خودبخود بهبود یافته و خطر خاصی برای بیمار ندارد.

منابع:

اسدی نوقابی، احمدعلی. دهقان نیری، ناهید. برونر و سودارث پرستاری داخلی جراحی (چشم و ENT). انتشارات نشر سالمی ۲۰۱۰

شماره تلفن بیمارستان: ۴۲۲۳۵۵۰۱-۳

توصیه هایی برای شما مددجو عزیز:

۱-

۲-

بسمه تعالی



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیلان

بیمارستان دکتر پیروز لاهیجان

اوتیت مدیا (عفونت گوش میانی):



آموزش به مددجو

کمیته آموزش به بیمار بیمارستان دکتر

پیروز لاهیجان

۱۳۹۸

اوتیت مدیا:

عفونت در فضای گوش میانی باعث ملتهب شدن گوش میانی می شود و این روند ممکن است یک گوش و یا هر دو گوش را با هم گرفتار کند. این بیماری خصوصاً در میان کودکان بسیار شایع است و همچنین شایعترین علت کاهش شنوایی به حساب می آید. اگر چه این بیماری در کودکان شایع


است، ولی گاهی بزرگسالان را نیز مبتلا می کند. این بیماری خصوصاً در فصل زمستان و اوایل بهار شیوع دارد.

آیا عفونت گوش میانی یک بیماری جدی و خطرناک است؟

بله ، این بیماری بعثت اینک هم باعث گوش درد شدید و هم کاهش شنوایی می شود باید جدی گرفت شود زیرا مثلاً کاهش شنوایی خود باعث ایجاد تبعات دیگر مثل اختلال در یادگیری و حتی تأخیر در سخن گفتن خواهد شد. در هر صورت اگر بیماری به موقع تشخیص داده شده و سریعاً درمان شود، شنوایی تقریباً همیشه به مقدار طبیعی خود باز خواهد گشت. از طرف دیگر ، این بیماری بعثت گسترش عفونت به ساختارهای اطراف خود می تواند عوارض وخیم دیگری را نیز بوجود آورد مثل آبسه مغزی، عفونت استخوان پشت گوش (ماستوئید) و یا مننژیت (التهاب پرده مغز) و ... بنابراین شناخت علائم آن و رساندن سریع کودک به پزشک برای جلوگیری از عوارض خطرناک لازم می باشد.

دلایل ابتلا به عفونت گوش میانی چیست ؟

انسداد قسمتی از گوش (شیپور استاش) مثلاً در هنگام سرماخوردگی، حساسیت و یا سایر عفونت های تنفسی در کنار حضور باکتری یا ویروس در گوش میانی باعث تجمع مایع (در اثر تولید چرک و ترشحات مخاطی) در گوش میانی و در پشت پرده صماخ می شود. هر چه حجم مایع تجمع یافته در گوش میانی بیشتر شود باعث بالا رفتن فشار فضای گوش میانی و همچنین به بیرون برآمده شدن پرده صماخ و درد گوش و تورم آن می شود. در این حالت بعثت اینک در پشت پرده گوش مایع وجود دارد، ارتعاش پرده صماخ مختل شده و شنوایی کاهش می یابد.



علائم عفونت گوش میانی چیست؟

در نوزادان و شیر خواران علائم زیر دیده می شود:

کشیدن و چنگ انداختن به گوش خصوصاً اگر همراه با موارد زیر باشد :

مشکلات شنوایی - گریه و بی قراری - تب - استفراغ - خروج ترشحات چرکی از گوش

در کودکان بزرگتر ، نوجوانان و بالغین علائم زیر انتظار می رود :

احساس پری یا فشار در گوش - مشکلات شنوایی - سرگیجه - و اختلال در تعادل - تهوع و استفراغ - خروج ترشحات از گوش - تب

