

نکاتی جهت اثربخشی بهتر قرص دیگوکسین:

برای پیشگیری از مسمومیت با قرص، مقادیر کافی مواد غذایی حاوی پتاسیم مانند میوه های خشک، موز، پرتقال، گریپ فروت، هلو، آلو، طالبی، اسفناج، گوجه فرنگی و سیب زمینی مصرف کنید.

در طول درمان با این دارو، انجام آزمایشات مختلف جهت بررسی احتمال بروز مسمومیت با دارو ضروری می باشد.

نبض خود را به طور مرتب کنترل کنید. در صورتی که ضربان نبض کمتر از ۶۰ بار و یا بیشتر از ۱۰۰ بار در دقیقه باشد به پزشک اطلاع دهید.



علائم مسمومیت با دیگوکسین:

بی اشتها، تهوع، استفراغ، درد شکم، اختلالات بینایی و تاری دید، دو بینی و دید رنگی زرد یا آبی، گیجی و کند شدن بیش از حد نبض ها در صورت مشاهده این علائم به پزشک خود اطلاع دهید.

قرص دیگوکسین را می توان بدون توجه به زمان غذا خوردن مصرف کرد. در صورت فراموش کردن یک نوبت، به هیچ عنوان آن را مصرف نکنید و در زمان مصرف بعدی آن را دو برابر نکنید.




داروی دیگوکسین چیست؟

داروی دیگوکسین برای افزایش قدرت قلب برای تلمبه کردن خون به کار می رود.

این دارو تعداد ضربان قلب را بهبود می بخشد و در نتیجه گردش خون بهبود یافته و علائم ناشی از وضعیت بد کارکرد قلب شامل تنگی نفس و ورم دست ها و پاها کاهش می یابد.

دیگوکسین به صورت قرص تزریقی و قطره خوراکی در دسترس است.

برای تعیین مقدار دیگوکسین در خون در افرادی که طولانی مدت از این قرص استفاده میکنند، آزمایش خون گرفته می شود.



بسمه تعالی



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیلان
بیمارستان دکتر پیروز لاهیجان

دیگوکسین



آموزش به مددجو

کمیته آموزشی بیمارستان دکتر پیروز
۱۳۹۸

• با گذشت تاریخ انقضای دارو حتما آن را دور بریزید.

• در صورت بارداری و شیردهی حتما پزشک خود را در جریان قرار دهید.

منبع:

کتاب داروهای ژنریک ایران، تهران، تالیف رامین خدام ۱۳۹۵

شماره تلفن بیمارستان: ۳-۴۲۲۳۵۵۰۱

نکات مورد توجه شما مددجوی گرامی:

۱-

۲-

۳-

۴-

♦ در صورت مشاهده هر کدام از علائم مسمومیت با دارو به پزشک اطلاع دهید.

♦ بهتر است دارو هر روز در زمان یکسانی مصرف شود و معمولاً بهتر است که صبح ها ناشتا خورده شود.

♦ اگر عادت دارید که برای صبحانه غلات برشته بخورید، دیگوکسین را حداقل یک ساعت قبل یا ۲ ساعت بعد از صبحانه مصرف کنید.

♦ میزان مایعات دریافتی و میزان دفع خود را کنترل نمایید. در صورت عدم تعادل بین آنها و یا ایجاد ورم در بدن با پزشک مشورت کنید.

شرایط نگهداری دیگوکسین :

دیگوکسین را در بسته مخصوص آن کاملاً پوشیده و دور از دسترس اطفال نگه دارید. دارو باید در دمای اتاق دور از نور مستقیم خورشید و یا حرارت زیاد و رطوبت نگهداری شود.